





SCYLLUS-Infora





Extra: nederlandse zoetwater-vissen

Informatiebulletin van
Onderwatersportvereniging
Scyllus

Heeft U informatie die u graag onder de
Scyllus-leden wilt verspreiden? Stuur deze dan naar: info@scyllus.nl

Onderwatersportvereniging **SCYLLUS**
Postbus N° 9702
5602 LS Eindhoven
KvK Eindhoven N° H171599450000
Rabobank Eindhoven 1700.30.350
E-Mail adres: info@scyllus.nl
Website: <http://www.scyllus.nl>

	<p>BAARS HERKENNING: De 2 rugvinnen zijn gescheiden, waarvan de voorste uitsluitend harde stekels heeft. Op de achterzijde van de voorste rugvin bevindt zich een zwarte vlek. Over het lichaam lopen een aantal verticale donkere banden. VERSPREIDING: Algemeen, komt voor in niet te troebel water. VOEDSEL: Eet allerlei dierlijk voedsel, maar boven een lengte van 15cm. vooral vis LENGTE TOT CIRCA: 50cm.</p>
	<p>SNOEKBAARS HERKENNING: De 2 rugvinnen zijn gescheiden, waarvan de voorste uitsluitend harde stekels heeft. De bovenkaak loopt door tot achter het violet oplichtende oog. VERSPREIDING: Ingeburgerd en algemeen, komt voor in troebele en diepe heldere wateren. Heeft daarbij voorkeur voor een stevige bodem. VOEDSEL: Hoofdzakelijk kleine vis. LENGTE TOT CIRCA: 120cm.</p>
	<p>SNOEK HERKENNING: Anaalvin en rugvin bevinden zich ver achterwaarts op het lichaam. De kop loopt uit in een platte brede bek. Het lichaam is getekend met goudkleurige stippen of strepen. VERSPREIDING: Algemeen, de snoek heeft een voorkeur voor heldere wateren omgeven door plantenrijke oeverzones. VOEDSEL: Zijn prooi bestaat hoofdzakelijk uit vis. LENGTE TOT CIRCA: 140cm.</p>
	<p>AAL / PALING HERKENNING: het lichaam is slangachtig van vorm. De borstvinnen bevinden zich direct achter de kop. Op het achterste deel van het lichaam is zowel onder als boven, een vinzoom aanwezig die uitloopt in de staartpunt. De buikvinnen ontbreken. VERSPREIDING: algemeen, trekt meestal als glasaal van ca. 6 cm. lengte vanuit zee de binnenwateren in volwassen exemplaren trekken terug naar zee om zich voort te planten. VOEDSEL: het voorkeurs voedsel bestaat uit insectenlarven en kleine kreeftachtigen. Grote exemplaren eten ook wel visjes en weekdieren. LENGTE TOT CIRCA: 125 cm.</p>

	<p>(SCHUB) KARPEN HERKENNING: In de Nederlandse wateren komen van de karpers 4 verschillende beschubbingstypen voor. Deze typen worden aangeduid als schubkarper, spiegelkarper, rijenkarper en naaktkarper. Er zijn 4 bekdraden aanwezig, waarvan 2 in de hoeken van de bek en 2 kortere op de bovenlip. De rand van de rugvin is hol ingesneden. De voorste vinstraal van de rugvin is stevig en getand. DE RIJENKARPEN is van de andere karpertypen te onderscheiden door het voorkomen van een enkele rij grote schubben op de zijlijn. DE NAAKTARPEN is van andere karpertypen te onderscheiden doordat geen of slechts enkele schubben aanwezig zijn. VERSPREIDING: algemeen, komt door uitzetting in veel wateren voor. VOEDSEL: insectenlarven, kleine kreeftachtigen, weekdieren en wormpjes. LENGTE TOT CIRCA: 120 cm.</p>
	<p>BLANKVOORN HERKENNING: de bek is eindstandig, boven in het oog bevindt zich een rode vlek. Voorzijde rugvin boven de voorzijde buikvinnen. Op de zijlijn liggen 43-47 schubben. VERSPREIDING: is algemeen, komt voor in allerlei watertype. VOEDSEL: voornamelijk slakjes, insectenlarven en soms plantdelen. LENGTE TOT CIRCA: 45 cm.</p>
	<p>BRASEM: HERKENNING: kleine exemplaren kunnen verward worden met de kolblei. Aantal rijen schubben boven de zijlijn bedraagt 12 tot 14. De oogdiameter is kleiner dan de afstand van het oog tot de punt van de bek. De bek is onderstandig en ver uitstulpbaar. VERSPREIDING: komt voor in allerlei watertype. VOEDSEL: voornamelijk insectenlarven, kleine kreeftachtige en wormpjes. LENGTE TOT CIRCA: 80 cm</p>
	<p>ZEELT HERKENNING: de iris van het oog is oranje gekleurd, en de vinnen zijn bolrond. Er zijn 2 korte bekdraden aanwezig. Onder de dikke slijmhuide bevinden zich op de zijlijn 95-120 kleine schubben. VERSPREIDING: algemeen, komt voor in wateren met veel plantengroei en een zachte bodem. VOEDSEL: voornamelijk insectenlarven, wormen en slakjes. LENGTE TOT CIRCA: 60 cm</p>